

แบบคัดกรองและส่งต่อ
ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)

วัน เดือน ปี _____

ชื่อผู้ป่วย _____ อายุ _____ ปี โทรศัพท์ _____

ผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

- ไข้สูง และไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน
- ไข้สูง ชี้น นอนซม เพลียมาก
- อาเจียนมากรับประทานอาหารไม่ได้
- ไอมาก
- หายใจถี่* หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
- เจ็บหน้าอกเวลาไอ หรือหายใจทุกครั้ง
- เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 5 ปี หรือ อายุมากกว่า 65 ปี

หญิงตั้งครรภ์ โรคอ้วน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน เอดส์ เป็นต้น และ ผู้ที่ได้รับยาแอสไพรินเป็นเวลานาน*

* **หายใจถี่** สังเกตจังหวะการเคลื่อนไหวของท้อง **เด็ก** มากกว่า 50 ครั้ง/นาที **ผู้ใหญ่** มากกว่า 30 ครั้ง/นาที

หากผู้ป่วยมีอาการข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นให้**ส่งต่อแพทย์** ทันที (โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่) พร้อมทั้งให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

- สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด
- รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น หากจำเป็นต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น
- ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อยๆ

ชื่อร้านยา _____ ที่อยู่ _____

ชื่อผู้ส่งต่อ _____ โทรศัพท์ _____

*ปรับปรุงครั้งที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552 : โดยคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข /คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แนวทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ให้ติดตามใน www.moph.go.th

แบบคัดกรองและส่งต่อ
ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)

วัน เดือน ปี _____

ชื่อผู้ป่วย _____ อายุ _____ ปี โทรศัพท์ _____

ผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

- ไข้สูง และไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน
- ไข้สูง ชี้น นอนซม เพลียมาก
- อาเจียนมากรับประทานอาหารไม่ได้
- ไอมาก
- หายใจถี่* หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
- เจ็บหน้าอกเวลาไอ หรือหายใจทุกครั้ง
- เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 5 ปี หรือ อายุมากกว่า 65 ปี

หญิงตั้งครรภ์ โรคอ้วน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน เอดส์ เป็นต้น และ ผู้ที่ได้รับยาแอสไพรินเป็นเวลานาน*

* **หายใจถี่** สังเกตจังหวะการเคลื่อนไหวของท้อง **เด็ก** มากกว่า 50 ครั้ง/นาที **ผู้ใหญ่** มากกว่า 30 ครั้ง/นาที

หากผู้ป่วยมีอาการข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นให้**ส่งต่อแพทย์** ทันที (โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่) พร้อมทั้งให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

- สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด
- รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น หากจำเป็นต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น
- ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อยๆ

ชื่อร้านยา _____ ที่อยู่ _____

ชื่อผู้ส่งต่อ _____ โทรศัพท์ _____

*ปรับปรุงครั้งที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552 : โดยคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข /คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แนวทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ให้ติดตามใน www.moph.go.th